Changement climatique : le certain, le probable, le possible et l'inconnu

François-Marie
Bréon

Laboratoire des Sciences du
Climat et de l'Environnement

CEA-CNRS-UVSQ

On part de la littérature scientifique

Rapport complet (500-1000 pages)

"Résumé pour les décideurs"
(20-30 pages)

Et la communication grand public qui va avec...

Groupe 1
Science du climat

Groupe 2
Impact et vulnérabilité

Groupe 3
Atténuation du CC

Le GIEC a été établi en 1988 par l'Organisation Météorologique Mondiale (WMO) et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (UNEP)

Messages clés

19 points

Résumé pour Décideurs
~14,000 mots

14 Chapitres
Atlas des projections

54,677 commentaires
de 1089 experts

259 auteurs
et 600 contributeurs

9200 publications citées

Chapter 1: Introduction

Chapter 2: Observations: Atmosphere and Surface

Chapter 3: Observations: Ocean

Chapter 4: Observations: Cryosphere

Chapter 5: Information from Paleoclimate Archives

Chapter 6: Carbon and Other Biogeochemical Cycles

Chapter 7: Clouds and Aerosols

Chapter 8: Anthropogenic and Natural Radiative Forcing

Chapter 9: Evaluation of Climate Models

Chapter 10: Detection and Attribution of Climate Change: from Global to Regional

Chapter 11: Near-term Climate Change: Projections and Predictability

Chapter 12: Long-term Climate Change: Projections, Commitments and Irreversibility

Chapter 13: Sea Level Change

Chapter 14: Climate Phenomena and their Relevance for Future Regional Climate Change

megadeltas, particularly the Zhujiang delta, Changjiang delta and Huanghe delta, are also economically important, accounting for a substantial proportion of China's total GDP (Niou, 2002; She, 2004). Ecologically, the Asian megadeltas are critical diverse ecosystems of unique assemblages of plants and animals located in different climatic regions (IUCN, 2003b; ACIA, 2005; Macintosh, 2005; Sanlaville and Prieur, 2005). However, the megadeltas of Asia are vulnerable to climate change and sea-level rise that could increase the frequency and level of inundation of megadeltas due to storm surges and floods from river drainage (Nicholls, 2004; Woodroffe et al., 2006) putting communities, biodiversity and infrastructure at risk of being damaged. This impact could be more pronounced in megacities located in megadeltas where natural ground subsidence is enhanced by human activities, such as in Bangkok in the Chao Phraya delta, Shanghai in the Changjiang delta, Tianjin in the old Huanghe delta (Nguyen et al., 2000; Li et al., 2004a; Jiang, 2005; Li et al., 2005; Woodroffe et al., 2006). Climate change together with human activities could also enhance erosion that has, for example, caused the Lena delta to retreat at a rate of 3.6 to 4.5 m/yr (Leont'yev, 2004) and has affected the progradation and retreat of megadeltas fed by rivers originating from the Tibetan Plateau (Li et al., 2004b; Thanh et al., 2004; Shi et al., 2005; Woodroffe et al., 2006). The adverse impacts of salt-water intrusion on water supply in the Changjiang delta and Zhujiang delta, mangrove forests, agriculture production and freshwater fish catch, resulting in a loss of US\$125x10⁶ per annum in the Indus delta could also be aggravated by climate change (IUCN, 2003a, b; Shen et al., 2003; Huang and Zhang, 2004).

Externally, the sediment supplies to many megadeltas have been reduced by the construction of dams and there are plans

glaciers form a unique reservoir which supports perennial rivers such as the Indus, Ganga and Brahmaputra which, in turn, are the lifeline of millions of people in South Asian countries (Pakistan, Nepal, Bhutan, India and Bangladesh). The Gangetic basin alone is home to 500 million people, about 10% of the total human population in the region.

Glaciers in the Himalaya are receding faster than in any other part of the world (see Table 10.9) and, if the present rate continues, the likelihood of them disappearing by the year 2035 and perhaps sooner is very high if the Earth keeps warming at the current rate. Its total area will likely shrink from the present 500,000 to 100,000 km² by the year 2035 (WWF, 2005).

The receding and thinning of Himalayan glaciers can be attributed primarily to the global warming due to increase in anthropogenic emission of greenhouse gases. The relatively high population density near these glaciers and consequent deforestation and land-use changes have also adversely affected these glaciers. The 30.2 km long Gangotri glacier has been receding alarmingly in recent years (Figure 10.6). Between 1842 and 1935, the glacier was receding at an average of 7.3 m every year; the average rate of recession between 1985 and 2001 is about 23 m per year (Hasnain, 2002). The current trends of glacial melts suggest that the Ganga, Indus, Brahmaputra and other rivers that criss-cross the northern Indian plain could likely become seasonal rivers in the near future as a consequence of climate change and could likely affect the economies in the region. Some other glaciers in Asia – such as glaciers shorter than 4 km length in the Tibetan Plateau – are projected to disappear and the glaciated areas located in the headwaters of the Changjiang River will likely decrease in area by more than 60% (Shen et al., 2002).

L'affaire des glaciers de l'Himalaya. 6 lignes dans un texte de 800 pages...

Température à Paris-Montsouris annuelle 1675-2013
Ecart a la moyenne 1971-2000

Ecart le plus froid: -3,3 en 1879 Ecart le plus chaud: +1,9 en 2011

Chacune des trois dernières décennies a été successivement plus chaude à la surface de la Terre que toutes les décennies précédentes depuis 1850.

Dans l'hémisphère nord, la période 1983–2012 a *probablement* été la période de 30 ans la plus chaude des 1400 dernières années (*confiance moyenne*)

Northern Hemisphere spring snow cover

Arctic summer sea ice extent

Sur les deux dernières décennies, la masse des calottes glaciaires a diminué, les glaciers de pratiquement toutes les régions du monde ont continué à reculer, et les étendues de la banquise arctique et du manteau neigeux de printemps de l'hémisphère nord ont diminué (*degré de confiance élevé*)

De multiples éléments indiquent que l'Arctique connaît un réchauffement important depuis le milieu du XX^e siècle.

≈18 cm en un siècle
Tendance à accélération

Depuis le milieu du XIX^{ème} siècle, le taux d'élévation du niveau moyen des mers est supérieur au taux moyen des deux derniers millénaires (*degré de confiance élevé*). Le niveau moyen des mers s'est élevé de 0,19 [0,17 à 0,21] m au cours de la période 1901–2010.

Observed change in annual precipitation over land

1901–2010

1951–2010

Des relevés incomplets montrent des tendances variables et non-significatives des précipitations globales. Les précipitations ont augmenté sur les terres des moyennes latitudes de l'hémisphère Nord depuis 1901 (*faible fiabilité* avant 1950, *fiabilité moyenne* après).

Aujourd'hui

Période glaciaire

Il y a 20 000 ans, période glaciaire. 3 km de glace sur Scandinavie et Canada, océan 100 m plus bas que aujourd'hui.

Température 5° C plus froide que aujourd'hui

Changement climatique attendu équivalent, mais en 100 ans (pas pour le niveau des mers)

Orbite de la Terre

Variabilité interne

Activité volcanique

Activité solaire

Facteurs anthropiques

+

≈ 10 Milliards
Tonnes C /an

L'effet de serre est provoqué par les gaz transparents au rayonnement solaire mais qui absorbent partiellement le rayonnement infrarouge par lequel la Terre se refroidit.

Principaux gaz: Vapeur d'eau, Gaz Carbonique, Méthane

C'est un effet naturel, sans lequel la vie ne serait pas possible sur Terre

Les émissions de CO₂ par les activités humaines sont en augmentation rapide.

Emissions de Carbone Fossile

Les concentrations de CO₂ ont augmenté de 40% depuis la période préindustrielle. Cette augmentation s'explique en premier lieu par l'utilisation de combustibles fossiles, et en second lieu par des émissions nettes dues à des changements d'utilisation des sols.

8.3 ± 0.4 PgC/yr 90%

+

1.0 ± 0.5 PgC/yr 10%

4.3 ± 0.1 PgC/yr

46%

2.6 ± 0.8

PgC/yr

28%

Calculé par différences des autres termes, du bilan

26%

2.5 ± 0.5 PgC/yr

Les mesures (directes ou carottes de glace) démontrent le caractère très inhabituel de l'évolution récente

- Gaz carbonique (CO₂) +35%
- Méthane (CH₄) X 2,5
- Protoxyde d'azote (N₂O) +15%

Depuis le début de l'ère industrielle la quantité d'énergie disponible pour « chauffer » les basses couches de l'atmosphère a augmenté de 2,5 Watts/m² (de 240 à 242,5) dont :

- * 60% pour le gaz carbonique
- * 20% pour le méthane
- * Longue durée de vie pour CO₂

Variations sur 10 000 ans

Les concentrations en GES (CO_2 , CH_4 , N_2O) ont augmenté de manière continue depuis le début de la période préindustrielle.

L'augmentation du CO_2 s'explique en premier lieu par l'utilisation de combustibles fossiles comme le montre les mesures isotopiques du CO_2 et celle de la concentration en oxygène.

Les variations des autres GHG s'explique par les activités humaines (agriculture)

- L'énergie "moteur" du climat provient essentiellement du soleil
- Une partie est renvoyée directement vers l'espace (réflexion, diffusion)
- La Terre se refroidit en émettant du rayonnement infrarouge (invisible)
- Les activités humaines peuvent modifier et

Le forçage radiatif quantifie la modification des flux radiatif (solaire et infrarouge) calculé à la tropopause, induite par une perturbation.

Difficulté : Qu'est ce que on suppose fixe ou variable ?

Calculation Methodology

Pinatubo
(1991)

Les grosses éruptions volcaniques injectent dans la stratosphère des particules qui y restent plusieurs années.
Ces particules réfléchissent une partie du rayonnement solaire, ce qui conduit à refroidir le climat pendant quelques années.
La contribution du volcanisme au forçage radiatif est très variable.

Les variations du flux solaire sont très faibles. Le cycle de ≈ 11 ans est de moins de 1‰ et les variations d'un cycle à l'autre encore plus faible.

Les mécanismes très indirects d'amplification proposés par certains climato-sceptiques ne sont ni quantifiés ni supportés par les observations

L'albédo est la fraction de rayonnement solaire non absorbé par la surface. Il dépend du type de surface. Le changement d'occupation des sols (déforestation) conduit à une augmentation de l'albédo, ce qui tend à refroidir le climat. L'impact via l'hydrologie est plus complexe et tend à contrebalancer cet effet.

L'impact des aérosols est difficile à quantifier du fait des distributions très hétérogènes, de la multiplicité des types d'aérosols, et des effets indirects sur les nuages.

Forçage radiatif sur le climat en 2011

Agent

Gaz à Effet de Serre

Ozone

H₂O Strato.

Albédo

Trainées avion

Aérosols

Total anthrop.

Soleil

Le CO₂ est le principal moteur de la perturbation humaine sur le climat, mais ce n'est pas la seule. Les aérosols ont un effet refroidissant mais qui reste mal quantifié.

Le forçage du climat augmente plus rapidement depuis les années 60. On note l'effet des éruptions volcaniques : intense mais de courte durée ($\approx 1-2$ ans)

Le méthane et les CFCs ont contribué à l'augmentation de l'effet de serre. Depuis une quinzaine d'année, c'est le CO₂ qui domine nettement l'augmentation supplémentaire

$$\Delta T = \eta(\Delta Q + f\Delta T)$$

$$\Delta T = \frac{\eta \Delta Q}{1 - \eta f}$$

La réaction initiale à un forçage (effet de serre, soleil) est relativement facile à estimer. **MAIS**, le système va varier (nuages, neige...) et donner lieu à des rétroactions, positives ou négatives. L'incertitude est là.

Lorsque la température augmente, la pression de vapeur saturante augmente très rapidement

A taux d'humidité constante, le contenu en vapeur d'eau de l'atmosphère va donc augmenter

Puisque H_2O est un puissant gaz à effet de serre, c'est une rétroaction positive très forte

Les émissions humaines d'eau (irrigation, centrales thermiques...) retombent sous forme de pluie. Les activités humaines n'ont pas d'impact direct sur la concentration atmosphérique en vapeur d'eau. C'est pourquoi la vapeur d'eau n'est pas traitée comme un "forçage" mais comme une "rétroaction".

A priori, un climat plus chaud conduit à une fonte des neiges plus rapide (effet déjà observé)

L'albédo de la Terre va donc diminuer

Le flux solaire absorbé va donc augmenter

Cela conduit à une hausse supplémentaire des températures

C'est une des causes du réchauffement plus important aux hautes latitudes, et de la fonte accélérée de la banquise

Rétroaction des nuages

Augmentation de l'albédo

Augmentation de l'effet de serre

Les nuages ont le pouvoir de moduler fortement Albédo et Effet de Serre

Le signe de la rétroaction des nuages est matière à débat.

C'est l'incertitude principale pour l'estimation du changement climatique

Pas de signe clair d'une modification globale de la couverture de nuageuse

Les processus et interactions sont complexes.

Une projection du changement climatiques passe nécessairement par la modélisation

Les modèles offrent une représentation 3D de l'atmosphère, de l'océan, des glaces de mer et surfaces continentales (couplages de différents modèles) et des couplages entre le climat et le cycle du carbone, les aérosols et l'usage des terres. Ils permettent de reproduire les conditions climatiques et les tendances de température observées à l'échelle des continents sur plusieurs décennies

RCP (Representative concentration pathways) [$W m^{-2}$] donnent des scénarii d'évolution de la perturbation anthropique au cours du 21^{ème} siècle.

Ces forçages sont utilisés en entrée des modèles de climat pour simuler l'évolution du climat au 21^{ème} siècle

Le changement de la température moyenne du globe en surface pour la fin du XXI^e siècle dépassera *probablement* 1,5°C par rapport à 1850-1900 pour tous les scénarios RCP, sauf pour le scénario RCP2.6. Il est *probable* qu'il dépassera 2°C pour les scénarios RCP6.0 et RCP8.5.

Le contraste de précipitation entre régions humides et régions sèches, et entre saisons humides et saisons sèches augmentera, bien qu'il puisse exister des exceptions régionales (*degré de confiance élevé*).

Précipitations maximales

Nombre jours secs consécutifs

Les événements de précipitations extrêmes deviendront très probablement plus intenses et fréquents sur les continents des moyennes latitudes et les régions tropicales humides d'ici la fin de ce siècle, en lien avec l'augmentation de la températures moyenne en surface

Cf Tableau SPM1 : 7 indicateurs liés à température, pluies ou vent

Selon une évaluation d'un sous-ensemble de modèles qui reproduisent le plus fidèlement la moyenne climatologique et la tendance de l'étendue de la banquise arctique sur la période 1979-2012, un océan Arctique pratiquement sans glace en septembre avant le milieu du siècle est *probable* d'après le scénario RCP8.5 (*degré de confiance moyen*).

Global mean sea level corrected for isostatic and tectonic contributions

← Période: 300 ans

Une transition a eu lieu entre la fin du XIX^e et le début du XX^e siècle, où l'on est passé de taux d'élévation du niveau moyen des mers relativement faibles des deux derniers millénaires à des taux plus importants (*degré de confiance élevé*).

← Période: 7000 ans

Le niveau moyen des mers continuera à s'élever au cours du XXI^e siècle. La vitesse d'élévation du niveau des mers dépassera *très probablement* la vitesse observée sur la période 1971–2010 pour tous les scénarios RCP, en raison du réchauffement accru des océans et de l'augmentation de la perte de masse des glaciers et des calottes glaciaires.

Le niveau moyen des mers continuera à s'élever au cours du XXI^e siècle. La vitesse d'élévation du niveau des mers dépassera *très probablement* la vitesse observée sur la période 1971–2010 pour tous les scénarios RCP, en raison du réchauffement accru des océans et de l'augmentation de la perte de masse des glaciers et des calottes glaciaires.

Estimation à partir des simulations incluant un couplage entre le climat et le cycle du carbone

Les émissions compatibles pour 2013-2100 sont estimées à

- 270** PgC pour RCP2.6 ,
- 780** PgC pour RCP4.5,
- 1060** PgC pour RCP6.0,
- 1685** PgC pour RCP8.5.

365 PgC déjà émis...

Il est *très probable* que plus de 20% du CO₂ émis par les activités humaines restera dans l'atmosphère plus de 1000 ans après l'arrêt des émissions. Cette très longue durée nécessaire aux puits de carbone pour éliminer le CO₂ anthropique rend le changement climatique irréversible à l'échelle humaine.

- Le CO_2 est le principal moteur du changement climatique mais d'autres contributions non négligeables
- Les principales incertitudes pour la quantification du forçage actuel est lié à l'impact des aérosols
- Les aérosols ont très probablement un effet refroidissant.
- Dans le futur, le forçage radiatif va très probablement augmenter, avec une contribution relative du CO_2 encore plus forte
- La rétroaction due aux nuages est la principale source d'incertitude pour le lien entre forçage et changement climatique
- Les changements climatiques annoncés sont considérables